

**ВНИМАНИЕ!**

**ОСОБО ОПАСНЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ!  
УГРОЗА ОТ КОРИЧНЕВОГО  
МРАМОРНОГО КЛОПА!**



**Зимуют взрослые клопы** в сухих местах – внутри пней, стволов, в хозпостройках. Клопы проникают в дома через щели, под сайдинг, пережидая холодное время года. В период зимовки клопы снижают свою активность. **Весной** при выходе клопа из мест зимовки **очень важный** способ борьбы с ним – **ручной сбор**(сгребание, сметание)и **уничтожение насекомых**. Это очень важно,ведь **уничтожение одного клопа означает гибель последующих поколений**.Один клоп за год теоретически может **дать до 6,75 млн. штук потомства**. Необходимо на своем участке произвести **тщательный осмотр** всех укромных мест, щелей, провести очистку стволов деревьев от неживых слоев коры и прочее.



**При температуре выше +10<sup>0</sup>С клоп выходит из мест зимовки**и начинает активно питаться перед спариванием. В этот период необходимо применять инсектициды в местах скопления клопов. Также развешивают феромонные ловушки для выявления и отлова клопа. Возможно применение световых ловушек (белая бумага с электрической лампочкой, под которой размещают сосуд с мыльным раствором). Обычно размещают 13 ловушек на гектар (примерно через 25-30 метров). В частном секторе – 1 ловушка на участок.

# РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР ИНФОРМИРУЕТ



**Одна самка откладывает до 300 яиц!**

При обнаружении единичных кладок яиц, их можно уничтожить вручную. За один обход можно уничтожить не одну тысячу будущих особей. Такой способ борьбы имеет смысл, так как «травить» яйца бесполезно, а вылупившиеся личинки так или иначе успеют навредить растениям до обработки химикатами или другими средствами. Осматривать растения нужно сразу после всходов. **Обращайте внимание на нижнюю сторону листа**, на которой обычно располагаются кладки яиц.



При отрождении личинок химический метод является наиболее действенным способом борьбы с вредителем. Эффективными в борьбе с личинками и имаго клопа зарекомендовали себя препараты Актара, Децис Эксперт, Танрек и целый ряд других препаратов (спросите у специалиста в магазине, какие есть в наличии).



**Обработки пестицидами** против взрослых особей клопа проводят **в вечерние часы**, когда летная активность вредителя снижается. Если численность вредителя высокая, то через 5-8 дней проводят вторую обработку (к периоду массового отрождения из яиц личинок первой генерации клопа). При необходимости проводят третью обработку в период появления личинок второй генерации.

**Важно помнить!** Начало ухода клопа на зимовку происходит после первой декады октября.



Уже начиная со второй декады сентября и до весны необходимо проводить регулярный осмотр возможных укрытий – хозяйственных построек, чердаков, подвалов, гаражей, штабелей досок, животноводческих помещений и др. Особое внимание - уделять труднодоступным местам: щелям, нишам.

Можно устроить клопам **фальшзимники**–развешивать на участке на высоте 2-3 метра картонные коробки, наполненные мятым гофрированным картоном, газетами и т.п. Клоп устроится в них на зимовку и затем коробки необходимо сжечь.

Таким образом **можно существенно сократить численность зимующих клопов.**

**Контактные телефоны: 8(86148)5-44-64; 8(86148)5-24-11**